

일반의약품

약물 침투막이 생겨 효과가 좋은 무좀치료제



테르비나핀

[제품명] 터비뉴겔(테르비나핀)

[유효성분] 이 약 1g 중 : 테르비나핀(별규) 10 mg

[첨가제(보조제)] 벤질알코올 2 mg

[기타첨가제] 락트산, 에탄올, 정제수, 키토산, 프로필렌글리콜, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 미황색(연노랑)의 투명한 젤제

[효능·효과]

- Trichophyton(즉, T.rubrum, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이) 감염증 : 족부백선(무좀), 고부백선(대퇴부백선), 척부백선
- Pityrosporum orbiculare(Malassezia furfur)에 의한 전풍(어루러기)

[용법·용량]

사용방법 :

이 약은 1일 1회 적용합니다. 적용 전에 감염부위를 깨끗하게 씻고 말린 후 감염부위 및 그 주위에 얇게 바릅니다. 간찰(피부 스침)성 감염(유방 밑, 손, 발가락 사이, 둔부(엉덩이)사이, 서혜부)의 경우, 야간에는 거어즈를 덮어 사용할 수도 있습니다.

치료기간 :

1일 1회 1주 증상의 경감은 통상 2~3일 이내에 나타납니다. 불규칙한 사용 또는 조기 투약중지 시 재발의 위험성이 있습니다. 1주일 투약 후에도 증상이 개선 징후가 없다면 진단을 확인해 보아야 합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 사용하지 마십시오.

테르비나핀 및 이 약 성분에 대해 과민증의 전력이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 이상반응

1) 피부: 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍반(붉은 반점), 가려움, 자극감이 적용부위에 나타날 수 있습니다.

4. 임부 및 수유부에 대한 사용

- 동물에 대한 생식독성시험에서 태자독성의 위험성이 보고되지는 않았지만, 임부에 투여하는 경우에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돎)하는 경우에만 투여하십시오.
- 이 약은 모유 중에 분비되므로, 이 약을 투여 중인 수유부는 수유를 중단하십시오.

5. 어린이에 대한 투여

어린이에 대한 사용경험이 제한적이므로 투여하지 마십시오.

6. 적용상의 주의

- 이 약은 외용으로만 사용하십시오.
- 눈 주위에는 사용하지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 30°C 이하 저장

[포장단위] 20g/튜브, 30g/튜브

[최신정보확인방법]

이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 마십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용 보고 및 피해구제 신청] 1644-6223(한국의약품안전관리원)



공정거래위원회 | 한국소비자원

TBG20-20M007

작성일자: 2020.12.07

[제조의뢰자]



본사: 서울특별시 동대문구 천호대로 64
공장: 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로
200-23(1, 2A, 4A층)

[제조자]



충청남도 천안시 서북구 백석공단 1로 47